

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)¹

El BASDAI fue desarrollado para medir la actividad de la enfermedad en pacientes con espondilitis anquilosante.

Fecha: _____

Nombre de paciente: _____

Instrucciones

Por favor marque con una "X" el recuadro que representa su respuesta. Todas las preguntas se refieren a la última semana.

1. ¿Cómo describiría el grado global de fatiga /cansancio que ha experimentado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ausente muy intensa

2. ¿Cómo describiría el grado global de dolor en cuello, espalda o caderas debido a su enfermedad?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ausente muy intenso

3. ¿Cómo describiría el grado global de dolor-hinchazón en otras articulaciones fuera de cuello, espalda o caderas?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ausente muy intenso

4. ¿Cómo describiría el grado global de malestar que ha tenido en zonas dolorosas al tacto o a la presión?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ausente muy intenso

5. ¿Cómo describiría el grado global de rigidez matutina que ha tenido al despertar?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ausente muy intensa

6. ¿Cuánto tiempo dura su rigidez matutina tras despertarse?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 horas 1 hora 2 horas o más

Referencia: 1. R. Ariza-Ariza, B. Hernández-Cruz y F. Navarro-Sarabia. Rev Esp Reumatol 2004;31(6):372-8

CC2304217239 Fecha: 21/04/2023

Para mayor información lo invitamos a consultar el siguiente enlace: <https://www.novartis.com/candean-es/programas-de-pacientes-informacion-de-contacto>

Ó también puede escanear el QR adjunto:

