

Carte patient

ILARIS® 150 mg
Canakinumab - Voie sous-cutanée

Traitement de la maladie de Still active incluant la maladie de Still de l'adulte et l'arthrite juvénile idiopathique systémique (AJIs)

Cette carte contient des informations importantes de sécurité d'emploi que vous devez connaître avant et pendant votre traitement par ILARIS® (canakinumab).

- **Veuillez garder sur vous cette carte** et présentez-la aux professionnels de santé que vous rencontrerez pour les informer de votre traitement par canakinumab.
- **Lisez** attentivement la notice de canakinumab pour plus d'informations.

Avant le traitement par canakinumab :

- **Infections** : Vous ne devez pas recevoir de canakinumab si vous souffrez d'une infection active nécessitant un traitement médical.
- **Vaccinations** : Discutez avec votre médecin des vaccins dont vous pourriez avoir besoin avant de débuter le traitement par canakinumab.

Pendant le traitement par canakinumab :

- **Risque d'infections** : le traitement par canakinumab est associé à une augmentation du risque d'infections, qui peuvent être graves.

- Si vous développez une infection, il est possible que votre traitement par canakinumab doive être interrompu. Prévenez immédiatement votre médecin en cas de fièvre durant plus de 3 jours ou tout autre symptôme qui pourrait être dû à une infection. Consultez **immédiatement** un médecin si vous présentez des symptômes tels que :
 - fièvre prolongée, toux ou maux de tête, ou
 - rougeur, chaleur ou gonflement localisé de la peau, ou
 - toux persistante, perte de poids, fièvre même peu importante.

- **Syndrome d'activation macrophagique (SAM)** : Les patients atteints de la maladie de Still peuvent développer une affection appelée syndrome d'activation macrophagique, qui peut mettre la vie en jeu. Consultez immédiatement votre médecin si vos symptômes de la maladie de Still s'aggravent ou si vous présentez des symptômes qui pourraient être dus à une infection.

- **Grossesse** : si vous avez reçu du canakinumab lorsque vous étiez enceinte, il est important d'en informer le médecin de votre bébé ou l'infirmière, avant qu'il ne soit vacciné. Votre bébé ne doit pas recevoir des vaccins vivants au moins pendant les 16 semaines qui suivent votre dernière injection de canakinumab pendant la grossesse.

Nom du/de la patient(e) :

Nom des parents (si patient enfant) :

Dose de canakinumab prescrite :

Nom du médecin :

Numéro de téléphone du médecin :

Conservez cette carte avec vous après le début du traitement par canakinumab.

Des effets indésirables peuvent survenir lors du traitement par canakinumab.

Veuillez reporter ci-dessous vos dates et doses de traitement par canakinumab :

| Date de traitement | Dose injectée |
|--------------------|---------------|
| ____ / ____ / ____ | _____ mg |
| ____ / ____ / ____ | _____ mg |
| ____ / ____ / ____ | _____ mg |
| ____ / ____ / ____ | _____ mg |
| ____ / ____ / ____ | _____ mg |
| ____ / ____ / ____ | _____ mg |

► Assurez-vous d'avoir la liste de tous les autres médicaments que vous prenez lors de chaque visite chez un professionnel de santé.