

Patiënten
informatie 

Skin
to
live in

Xolair[®]
patiënten-
informatie

ONDERSTEUNING BIJ CHRONISCHE SPONTANEURTICARIA
EEN GEZONDE HUID, OM VAN TE GENIETEN

Xolair bij Chronische Spontaria Urticaria



Uw arts heeft u Xolair® (omalizumab) voorgeschreven om uw Chronische Spontane Urticaria (afgekort CSU) te behandelen. In deze folder kunt u lezen wat dit medicijn voor u kan betekenen. Deze folder vervangt de bijsluiter echter niet. U wordt aangeraden te allen tijde de bijsluiter goed door te nemen als uw arts u dit medicijn heeft voorgeschreven. Als de bijsluiter van Xolair® niet in uw bezit is kunt deze downloaden via www.novartis.nl/medicijnen/xolair

Wat is Xolair?

Het is een medicijn dat bedoeld is voor patiënten met CSU, die al antihistaminica gebruiken, maar bij wie de symptomen van CSU niet goed onder controle worden gebracht met deze medicijnen. Dit medicijn wordt tevens ingezet voor de behandeling van ernstig allergisch astma en chronische rinosinusitis met neuspoliepen.

De werkzame stof in het medicijn is omalizumab, een antilichaam tegen het lichaamseigen immunoglobuline E (IgE). Het kan na toediening de hoeveelheid van het lichaamseigen IgE verminderen en/of de werking van IgE op bepaalde

cellen blokkeren. Hierdoor wordt minder histamine vrij gemaakt. Histamine zorgt voor verwijding van de bloedvaten, zwelling en roodheid van de huid en ook jeuk. Wanneer de hoeveelheid histamine in de huid vermindert, kunnen jeuk, galbulten of angio-oedeem verminderen of verdwijnen. IgE en histamine spelen allebei een belangrijke rol bij het ontstaan van CSU.

Toediening

Het medicijn wordt iedere vier weken door uw arts toegediend. De voorgeschreven dosering van 300 mg wordt als een injectie van 300 mg of als twee afzonderlijke injecties van elk 150 mg, direct onder de huid toegediend. Samen met uw arts kan er ook besloten worden om het medicijn zelf thuis toe te dienen. Uw arts of verpleegkundige kunnen dit met u bespreken.

LET OP:

De volgende punten zijn belangrijk voor uw behandeling:

- Het medicijn moet volgens recept periodiek toegediend worden. Sla daarom geen enkele dosering over. Uw huidige medicatie voor de behandeling van CSU moet u blijven gebruiken tijdens de behandeling met het medicijn. Stop niet met het gebruik van een medicijn zonder eerst met uw arts te overleggen.
- Stop niet met het gebruik van het medicijn, tenzij uw arts dit zegt. Bij het (tijdelijk) stoppen van de behandeling kunnen de symptomen van uw aandoening weer terugkomen.
- De klachten van CSU kunnen soms vanzelf verdwijnen. Het kan dus zijn dat u uw medicijn op een bepaald moment niet meer nodig heeft. Uw arts kan daarom besluiten uw behandeling tijdelijk te stoppen om te kijken of de klachten van CSU weer terug komen. Volg hierbij de instructies van uw arts nauwkeurig.
- Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts zal de voordelen en mogelijke risico's van het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap met u bespreken.

Mogelijke bijwerkingen

Xolair® kan, zoals elk geneesmiddel, bijwerkingen veroorzaken.

De bijwerkingen die door het medicijn kunnen optreden, zijn doorgaans mild tot matig van aard, maar kunnen af en toe ernstig zijn.

Een aantal van de meest voorkomende bijwerkingen zijn: hoofdpijn, bovenste luchtweginfectie en artralgie.^{1,2}

Daarnaast is het mogelijk dat er een ernstige allergische reactie optreedt, waarbij het hele lichaam betrokken is met onder meer galbulten, jeuk, zwelling, piepende ademhaling (wheezing) of een daling van de bloeddruk (anafylactische reactie). Dit komt zelden voor. Neem direct contact met uw arts op indien een van deze bijwerkingen zich bij u voordoet!

Een voorgeschiedenis van een anafylactische reactie voordat u het medicijn gebruikte, kan een risicofactor zijn. Overleg met uw arts welke bijwerkingen nog meer kunnen optreden en raadpleeg voor de volledige informatie omtrent bijwerkingen de bijsluiter.

U beslist gezamenlijk met uw arts of het medicijn zelf kunt injecteren. De eerste 3 doses worden altijd gegeven door of onder supervisie van een zorgprofessional. Het is

belangrijk om goed getraind te zijn in het injecteren van het medicijn voordat u uzelf injecteert.

Het is ook belangrijk dat u het medicijn niet zelf injecteert totdat u bent getraind door uw arts of verpleegkundige op:

- het herkennen van vroege verschijnselen en klachten van ernstige allergische reacties;
- wat te doen als deze klachten zich voordoen.

Heeft u (het vermoeden van) een ernstige allergische reactie op dit medicijn? Bel 112 of neem direct contact op met een arts, apotheker of verpleegkundige.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze brochure staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Referenties

1. Bijsluiter Xolair® (omalizumab). <https://www.novartis.com/nl-nl/over/medicijnen/xolair>
2. Samenvatting van de productkenmerken Xolair®. <https://www.novartis.com/nl-nl/over/medicijnen/xolair>

Novartis Pharma B.V.
Postbus 22101 | 1100 CC AMSTERDAM
T 088 - 045 21 00 | www.novartis.nl