

WIST JE DAT?

De gemiddelde leeftijd waarop de eerste symptomen van axiale SpA zichtbaar worden, **26 jaar** is? (in de bloei van je leven dus).

TIJDENS EEN OPVLAMMING ONDERVINDEN MENSEN MET AXIALE SPA MOEITE MET:



69%

opstaan uit bed



69%

zich aankleden



71%

schoonmaken



76%

lichamelijke oefening



68%

trap oplopen

>7 JAAR DUURT HET GEMIDDELD


>7 jaar voordat mensen de diagnose axiale SpA krijgen. Bij vrouwen duurt het gemiddeld **2 jaar** langer dan bij mannen voordat zij worden gediagnosticeerd.

Meer weten over axiale SpA?



SCAN MIJ

 **NOVARTIS** | Reimaging Medicine

In samenwerking met stichting axiale SpA 

AXIALE SPA HEEFT GROTE IMPACT OP DE KWALITEIT VAN LEVEN

Werk

74%

heeft moeite een baan te vinden wegens axiale SpA



Axiale SpA heeft invloed op de keuze van een baan bij bijna de helft van mensen met axiale SpA

Dagelijks leven



83%

geeft aan dat de pijn een probleem is



54%

slaapt slecht



80%

meldt vermoeidheid



76%

heeft last van matige tot ernstige stijfheid van de wervelkolom gedurende de hele dag



>75%

heeft moeite met opstaan

Relaties

Tot **45%** ervaart dat de relatie met hun partner, familie, vrienden en collega's **lijdt onder hun ziekte**



>50% ervaart een negatieve impact op hun **seksleven**

