

Листок-вкладыш - информация для пациента**Ультибро® Бризхалер®, 50 мкг + 110 мкг, капсулы с порошком для ингаляций
Гликопиррония бромид + индакатерол**

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения!

- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, работнику аптеки или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

1. Что из себя представляет препарат Ультибро® Бризхалер®, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Ультибро® Бризхалер®
3. Применение препарата Ультибро® Бризхалер®
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Ультибро® Бризхалер®
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Ультибро® Бризхалер® и для чего его применяют

Препарат Ультибро® Бризхалер® содержит комбинацию двух действующих веществ: индакатерола малеат и гликопиррония бромид. Индакатерол является агонистом бета₂-адренорецепторов длительного действия, гликопиррония бромид является антагонистом мускариновых рецепторов. Действующие вещества индакатерол и гликопирроний относятся к группе лекарственных препаратов, известных как бронходилататоры. При ингаляции препаратом Ультибро® Бризхалер® у пациента отмечают облегчение дыхания.

Следует применять с помощью устройства для ингаляции (ингалятор) (используйте только ингалятор Ультибро® Бризхалер®, входящий в комплект упаковки). В упаковке Вы найдете ингалятор и капсулы (в блистерной упаковке), которые содержат действующие вещества индакатерол и гликопиррония бромид в форме порошка для ингаляций. Ингалятор Ультибро® Бризхалер® позволит Вам вдыхать содержащийся в капсулах препарат.

Фармакотерапевтическая группа: средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей; адренергические средства для ингаляционного введения; адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикоидами.

Код АТХ: R03AL04

Для чего применяют препарат Ультибро® Бризхалер®

Препарат Ультибро® Бризхалер® применяют для облегчения дыхания у пациентов, испытывающих проблемы с дыханием в связи с заболеванием легких, известным как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). При ингаляции препаратом у пациента отмечают облегчение дыхания.

Прием препарата Ультибро® Бризхалер® один раз в сутки поможет уменьшить влияние ХОБЛ на вашу повседневную жизнь.

Показания к применению препарата Ультибро® Бризхалер®

Препарат Ультибро® Бризхалер® предназначен для длительной поддерживающей терапии нарушений бронхиальной проходимости у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), облегчающей симптомы и снижающей количество обострений.

2. О чем следует знать перед применением препарата Ультибро® Бризхалер®

Тщательно выполняйте рекомендации лечащего врача. Они могут отличаться от общей информации в этом листке-вкладыше.

Противопоказания

Не применяйте препарат Ультибро® Бризхалер® в следующих случаях:

- если у Вас аллергия на гликопиррония бромид, индакатерол или другие ингредиенты этого лекарственного препарата (перечислены в разделе б);
- Если Вам до 18 лет;
- если у Вас есть непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (препарат содержит лактозу).

Препарат Ультибро® Бризхалер® не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими бета-адреномиметики длительного действия или

М-холиноблокаторы длительного действия.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Ультибро® Бризхалер® проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Препарат Ультибро® Бризхалер® не рекомендован для купирования острых эпизодов бронхоспазма.

Если что-либо из перечисленного ниже относится к Вам, сообщите об этом Вашему лечащему врачу до начала или во время приёма препарата Ультибро® Бризхалер®:

- если у Вас аллергическая реакция на фоне применения гликопиррония или индакатерола, компонентов препарата препарат Ультибро® Бризхалер® (симптомы см. в разделе 4.1 данного листка-вкладыша);
- если у Вас бронхиальная астма;
- если у Вас парадоксальный бронхоспазм (симптомы см. в разделе 4.1 данного листка-вкладыша);
- если у Вас заболевание глаз, известное как закрытоугольная глаукома (симптомы см. в разделе 4.1 данного листка-вкладыша);
- если у Вас есть нарушения работы сердца;
- если у Вас гипокалиемия, которая может привести к развитию нежелательных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы;
- если у Вас сахарный диабет;
- если у Вас бывают судороги или припадки;
- если у Вас заболевание щитовидной железы;
- если Вы принимаете аналогичные препараты для лечения болезни легких (см. раздел «Применение других лекарственных препаратов»);
- если у Вас есть нарушения функции почек тяжелой степени, включая терминальную стадию почечной недостаточности, требующую проведения гемодиализа;
- если у Вас тяжелое поражение печени тяжелой степени;
- если у Вас затрудненное мочеиспускание.

Дети и подростки (младше 18 лет)

Эффективность и безопасность не установлены.

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет поскольку эффективность и безопасность не установлены.

Пожилые люди (75 лет и старше)

Если Ваш возраст 75 лет или старше, Вы можете использовать препарат Ультибро® Бризхалер® в той же дозе, что и другие взрослые пациенты.

Другие препараты и препарат Ультибро® Бризхалер®

До начала приема препарата Ультибро® Бризхалер® сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете принимать любые другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты, по причине возможного взаимодействия с препаратом Ультибро® Бризхалер®:

- М-холиноблокаторы длительного действия и бета₂-адреномиметики длительного действия, которые помогают расширять воздухоносные пути в результате расслабления гладкой мускулатуры бронхов;
- препараты для лечения заболевания легких, которые содержат активные вещества, аналогичные (того же класса), что и в препарате Ультибро® Бризхалер® (их применение может увеличить риск возникновения возможных побочных эффектов);
- препараты, которые снижают уровень калия в крови. К ним относятся диуретики (также известные как «мочегонное» и применяемые для лечения гипертонии, напр. гидрохлоротиазид), другие бронходилататоры, такие как метилксантины, применяемые в терапии нарушений дыхания (напр., теофиллин), или стероиды (напр., преднизолон);
- бета-блокаторы, применяемые для лечения гипертонии и других заболеваний сердца (напр., пропранолол) или глаукомы (напр., тимолол);

Прием препарата Ультибро® Бризхалер® с пищей и напитками

Вы можете проводить ингаляции препаратом Ультибро® Бризхалер® в любое время до или после приема пищи или напитков.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны, предполагаете, что беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь с лечащим врачом о возможности применения препарата Ультибро® Бризхалер®.

Лечащий врач обсудит с Вами потенциальный риск, связанный с применением препарата Ультибро® Бризхалер® в период беременности или грудного вскармливания.

Применение препарата Ультибро® Бризхалер® у кормящих грудью женщин допустимо, только если предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для ребенка.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Ультибро® Бризхалер® не оказывает или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Однако препарат может вызывать головокружение. При возникновении головокружения следует отказаться от управления транспортными средствами и выполнения потенциально опасных видов деятельности.

Препарат Ультибро® Бризхалер® содержит

В перечень вспомогательных веществ входят: лактозы моногидрат, магния стеарат.

В препарате содержится лактоза.

Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, сообщите лечащему врачу до начала приема препарата.

3. Применение препарата Ультибро® Бризхалер®

Всегда применяйте препарат в точном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений обратитесь за консультацией к лечащему врачу или работнику аптеки.

Какое количество препарата Ультибро® Бризхалер® следует использовать для ингаляции

Рекомендуемая доза препарата Ультибро® Бризхалер® составляет 50 мкг + 110 мкг (содержимое 1 капсулы) 1 раз в сутки.

Путь и (или) способ введения

Ингаляцию препарата Ультибро® Бризхалер® проводят ежедневно 1 раз в сутки в одно и то же время, поскольку его действие сохраняется в течение 24 часов.

При отсутствии улучшения функции дыхания следует удостовериться, правильно ли Вы применяете препарат. Препарат следует вдыхать, а не глотать.

Как использовать препарат Ультибро® Бризхалер®

В упаковке Вы найдете ингалятор и капсулы (в блистерной упаковке), которые содержат препарат в форме порошка для ингаляций.

- Только для ингаляционного применения.
- Используйте только ингалятор, находящийся в данной упаковке (ингалятор Ультибро® Бризхалер®) для проведения ингаляций с использованием капсул с порошком.
- Не проглатывайте капсулы.

- Капсулы должны всегда храниться в блистере и извлекаться из него непосредственно перед использованием.
- Чтобы открыть блистер, снимите с него защитную пленку, не продавливайте капсулу через фольгу.
- Когда Вы начали использовать новую упаковку, используйте новый ингалятор Ультибро® Бризхалер®, который поставляется в комплекте с новой упаковкой.
- Ингалятор необходимо утилизировать после того, как все капсулы будут использованы.

Прочитайте инструкцию по применению ингалятора в конце данного листка-вкладыша для получения более подробной информации о том, как пользоваться ингалятором Ультибро® Бризхалер®.

Продолжительность терапии

Продолжайте применение препарата Ультибро® Бризхалер® согласно рекомендациям лечащего врача.

ХОБЛ — хроническое заболевание, и Вам следует применять препарат Ультибро® Бризхалер® **каждый день**, а не только при возникновении нарушений дыхания или других симптомов ХОБЛ.

Если у Вас есть вопросы о продолжительности лечения препаратом Ультибро® Бризхалер®, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Если Вы приняли препарата Ультибро® Бризхалер® больше, чем следовало

Предполагается, что передозировка препаратом Ультибро® Бризхалер® характеризуется симптомами, типичными для передозировки бета₂-адреномиметиками, такими как тахикардия, тремор, ощущение сердцебиения, головная боль, тошнота, рвота, сонливость, желудочковая аритмия, метаболический ацидоз, гипокалиемия и гипергликемия, а также симптомами, типичными для передозировки М-холиноблокаторами, такими как повышение внутриглазного давления (сопровождающееся болью в глазах, нарушением зрения или покраснением глаз), запор или затруднение мочеиспускания. Если у Вас возникли симптомы, перечисленные выше, **незамедлительно сообщить об этом Вашему лечащему врачу** или обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Вам может потребоваться медицинское наблюдение. Если есть возможность, покажите врачу упаковку.

Лечение передозировки

Показана поддерживающая и симптоматическая терапия. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация. В случае необходимости возможно применение селективных бета-адреноблокаторов. Применять селективные бета-адреноблокаторы

следует с осторожностью, только под строгим медицинским наблюдением, поскольку их применение может провоцировать развитие бронхоспазма.

Если Вы забыли принять препарат Ультибро® Бризхалер®

Если Вы забыли сделать ингаляцию, сделайте ее как можно раньше. Однако не делайте две ингаляции в сутки. Следующую ингаляцию следует совершить в обычное время на следующий день.

4. Возможные нежелательные реакции

Как и в случае с любыми другими препаратами, на фоне применения препарата Ультибро® Бризхалер® могут развиваться побочные эффекты, однако это происходит не у всех пациентов.

Описание нежелательных реакций

Прекратите применение препарата Ультибро® Бризхалер® и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вас развились любые из следующих симптомов:

- **прекратите применение препарата Ультибро® Бризхалер® и незамедлительно сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы испытываете тяжесть в области грудной клетки, у Вас наблюдаются кашель, хрипы или одышка сразу после ингаляции препарата Ультибро® Бризхалер® (проявления парадоксального бронхоспазма);**
- **прекратите применение препарата Ультибро® Бризхалер® и незамедлительно сообщите Вашему лечащему врачу, если у Вас затруднено дыхание или глотание, отек языка, губ или лица, кожная сыпь, зуд или крапивница (проявления аллергической реакции);**
- если во время лечения симптомы ХОБЛ, такие как одышка, хрипы или кашель, не улучшаются или ухудшаются;
- **прекратите применение препарата Ультибро® Бризхалер® и незамедлительно сообщите Вашему лечащему врачу, если у Вас боль или дискомфорт в глазах, временное помутнение зрения, радужные ореолы или цветные видения в комбинации с покраснением глаз (проявления острого приступа закрытоугольной глаукомы).**

Препарат Ультибро® Бризхалер® применяется в качестве поддерживающей терапии ХОБЛ. Не используйте препарат Ультибро® Бризхалер® для лечения внезапных приступов одышки или хрипов.

Другие возможные нежелательные реакции

Другие возможные нежелательные реакции перечислены ниже. Если эти нежелательные реакции приобретают тяжелое течение, обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Инфекции и инвазии: очень часто – инфекции верхних дыхательных путей; часто – назофарингит, инфекция мочевыводящих путей, синусит, ринит.

Нарушения со стороны иммунной системы: часто – гиперчувствительность, нечасто – ангионевротический отек² (внезапное появление сыпи или крапивницы).

Нарушения метаболизма и питания: часто – гипергликемия и сахарный диабет.

Психические нарушения: нечасто – бессонница.

Нарушения со стороны нервной системы: часто – головокружение, головная боль; редко – парестезия.

Нарушения со стороны органа зрения: нечасто – глаукома¹.

Нарушения со стороны сердца: нечасто – ишемическая болезнь сердца, мерцательная аритмия, тахикардия, ощущение сердцебиения.

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто – кашель, боль в ротоглотке, першение в горле; нечасто – носовое кровотечение, парадоксальный бронхоспазм, дисфония² (нарушение голосовой функции).

Желудочно-кишечные нарушения: часто – диспепсия, кариес зубов; нечасто – сухость слизистой оболочки полости рта, гастроэнтерит.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто – кожная сыпь/зуд.

Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани: нечасто – скелетно-мышечная боль, мышечный спазм, боль в конечностях, миалгия.

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: часто – обструкция мочевого пузыря, задержка мочи.

Общие нарушения и реакции в месте введения: часто – лихорадка¹, боль в грудной клетке; нечасто – периферические отеки, усталость.

Примечание:

¹ – нежелательные реакции (НР), отмечавшиеся на фоне применения комбинированного препарата Ультибро® Бризхалер® и не отмечавшиеся при применении каждого из компонентов в монотерапии.

² Сообщения были получены во время применения препарата в пострегистрационном периоде, но частоту рассчитывали на основании данных клинических исследований.

Описание отдельных нежелательных реакций

Кашель отмечался часто, но, как правило, был слабо выражен.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

www.roszdravnadzor.gov.ru

Республика Казахстан

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Адрес: 010000, г. Астана, ул. А.Иманова, 13, 4 этаж

Телефон: +7 7172 235 135

Электронная почта: farm@dari.kz, pdlc@dari.kz, vigilance@dari.kz

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ndda.kz

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Ультибро® Бризхалер®

Храните препарат в недоступном и невидном для детей месте.

Дата истечения срока годности (срока хранения)

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке или блистере после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре ниже 25 °С.

Беречь от воздействия влаги.

Предупреждения о признаках непригодности препарата к применению

Особые требования отсутствуют.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или с бытовыми отходами. Уточните у работников аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется.

Ингалятор необходимо утилизировать после того, как все капсулы будут использованы.

Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Ультибро® Бризхалер® содержит

Действующими веществами препарата являются индакатерола малеат и гликопиррония бромид.

Каждая капсула содержит 143 микрограмма индакатерола малеата, эквивалентных 110 микрограммам индакатерола основания, и 63 микрограмма гликопиррония бромида, эквивалентных 50 микрограммам гликопиррония основания.

Прочими вспомогательными веществами являются:

- Содержимое капсулы: лактозы моногидрат, магния стеарат;
- Оболочка капсулы: гипромеллоза, вода очищенная, каррагинан, калия хлорид, тартразин (E102), черные чернила, синие чернила.

Внешний вид препарата Ультибро® Бризхалер® и содержимое упаковки

В упаковке Вы найдете устройство для ингаляции и капсулы с порошком для ингаляций в блистерных упаковках.

Твердые прозрачные капсулы с бесцветным корпусом и крышечкой желтого цвета, с маркировкой.

Маркировка: «U» - логотип черного цвета на крышечке; надпись «IGP110.50» синими чернилами под двойной синей полосой на корпусе.

Содержимое капсул: порошок белого или почти белого цвета, без видимых механических включений.

Размер: № 3.

По 6 или 10 капсул в блистер из ориентированный ПА/Ал/ПВХ и алюминиевой фольги.

По 1, 2, 3 или 5 блистеров вместе с листком-вкладышем применению и устройством для ингаляций (бризхалер) в картонную пачку.

Допускается наличие контроля первичного вскрытия на картонной пачке.

Держатель регистрационного удостоверения

Новartis Фарма АГ, Лихтштрассе 35, 4056 Базель, Швейцария / Novartis Pharma AG,

Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland.

Производитель

Выпускающий контроль качества

Новартис Фарма ГмбХ, Роонштрассе 25 и Обере-Турнштрассе 8-10, 90429 Нюрнберг, Германия / Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25 und Obere Turnstrasse 8-10, 90429 Nurnberg, Germany;

Новартис Фарма Штейн АГ, Шаффхаузерштрассе, 4332 Штейн, Швейцария / Novartis Pharma Stein AG, Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Switzerland.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «Новартис Фарма»

Адрес: 125315 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 70

Телефон: +7 495 967 12 70

Факс: +7 495 967 12 68

Электронная почта: drug.safety_russia@novartis.com

Республика Казахстан

Филиал Компании «Новартис Фарма Сервисэз АГ» в Республике Казахстан

Адрес: 050022 г. Алматы, ул. Курмангазы, 95

Телефон: +7 727 258 24 47

Электронная почта: drugsafety.cis@novartis.com

Данный листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся на веб-сайте Союза.

<https://eec.eaeunion.org>.

Указания по применению устройства для ингаляций Ультибро® Бризхалер®


Каждая упаковка препарата Ультибро® Бризхалер® содержит:

- Одно устройство для ингаляций – бризхалер;
- Блистеры с капсулами с порошком для ингаляций.



В этом разделе приведены указания по применению устройства для ингаляций, а также уходу за ним. Пожалуйста, перед использованием ингалятора Бризхалер® внимательно ознакомьтесь с инструкцией и следуйте приведенным рекомендациям.


При возникновении дополнительных вопросов обратитесь к медицинскому специалисту.



Шаг 1а:
Снимите
крышку



Шаг 1б:
Откройте
ингалятор



Шаг 1с:

Шаг 2а:
Проколите
капсулу один раз

Держите
ингалятор
вертикальном
положении.

Проколите
капсулу,
одновременно
нажав на обе
боковые кнопки.


При
прокалывании
капсулы должен
раздаться щелчок.
Не прокалывайте
капсулу более
одного раза.



Шаг 2б:
Отпустите

в

Шаг 3а:
Сделайте полный
выдох
Не дуйте в
устройство для
ингаляций.



Шаг 3б:
Глубоко вдохните
препарат

Держите ингалятор
как показано на
рисунке.

Вложите мунштук
устройства в рот и
плотно сожмите его
губами.

Убедитесь, что

капсула пуста

Откройте ингалятор
и убедитесь, что в
капсуле не осталось
порошка.

Если в капсуле
остался порошок:

- Закройте
ингалятор.
- Повторите шаги
3а–3с.



Порошок остался Пустая капсула




Извлеките капсулу
Отделите один блистер от блистерной упаковки.
Снимите с блистера защитную пленку и извлеките капсулу.
Не нажимайте на блистер, чтобы извлечь капсулу.
Не глотайте капсулу.



Шаг 1d:

боковые кнопки

Не нажимайте на боковые кнопки.
Сделайте быстрый, равномерный и максимально глубокий вдох.
Во время ингаляции вы услышите дребезжащий звук.
Вы можете почувствовать вкус препарата во время вдоха.




Шаг 3с:

Задержите дыхание
Задержите дыхание на 5 секунд.

Извлеките пустую капсулу
Утилизируйте пустую капсулу вместе с бытовыми отходами.
Закройте ингалятор и наденьте крышку.

**Вставьте
капсулу**
Никогда не
помещайте
капсулу
непосредственно
в мундштук.



Шаг 1е:
**Закройте
ингалятор**

Важная информация

- Капсулы препарата Ультибро® Бризхалер® должны храниться в блистерной упаковке и извлекаться непосредственно перед использованием.
- При извлечении капсулы из блистера не продавливайте ее через фольгу.
- Не глотайте капсулу.
- Не используйте капсулы препарата Ультибро® Бризхалер® с другими устройствами для ингаляций.
- Не используйте устройство для ингаляций Бризхалер® с другими препаратами.
- Не помещайте капсулы в рот или мундштук устройства для ингаляций.
- Не нажимайте на боковые кнопки более одного раза.
- Не дуйте в мундштук.
- Не нажимайте на боковые кнопки при вдохе через мундштук.
- Берите капсулы только сухими руками.
- Не мойте ингалятор водой.

Чистка устройства для ингаляций

Протрите мундштук внутри и снаружи чистой сухой тканью без ворса, чтобы очистить его от остатков порошка. Храните ингалятор сухим. Не мойте ингалятор водой.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 29.05.2024 № 10610
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Утилизация ингалятора после использования

После использования всех капсул устройство для ингаляций необходимо утилизировать. Информацию о способах утилизации препарата и ингалятора можно получить у медицинского работника.